

radu pre pestovateľov
Štiplavá paprika

Atomic

(Capsicum frutescens)

Pokračovanie v pestovaní:

8" (20 cm) - 12" (30 cm) črepník



Substrát: Použite rašelinovú pestovaciu zmes strednej štruktúry s ílom s pH 5,5-6,2 a EC <1mmhos.

Teploty: Denné teploty môžu byť 18-21 °C, nočné teploty môžu byť 13-16 °C.

Svetlo: Úrovne svetla by mali byť zvýšené a udržiavané na 4000-5000 f.c.

Zavlažovanie: Po presadení, zabezpečte dobre mokrý / suchý cyklus na podporu rastu koreňa a kontrolu výšky rastliny. To pomôže aj proti škodcom a nástupu chorôb. Keď začne rastlina kvitnúť, nechajte rastlinu skôr suchú tento stres spôsobí bohatšie zakvitanie - viac plodov. Pomáha to tiež regulovať výšku rastliny. Keď budú plody nahodené predídte vädnutiu. Tým sa zabráni ukončeniu rastu plodov a hnilobe kvetu.

Hnojivo: Hnojte každé 2. alebo 3. zavlažovanie vyváženým hnojivom ako napr. 13-2-13 alebo 15-0-15 pri a rýchlosti 150-200ppm. Vápnik je dôležitý. Pridajte vápnik do hnojiva alebo použite produkt na báze vápnika. Keď bude mať rastlina prvé plody, zvýšte hnojenie na každé zalievanie.

Regulátory rastu: Pestovaním pri správnej vlhkosti, kombinácii hnojív so správnymi úrovňami osvetlenia a teploty by mali obmedziť potrebu PGR.

Táto odroda je prirodzene kompaktná.

NEPOUŽÍVAŤ

Presádzanie po predaj:

črepník	plánt na črepník	nahodenie plodov	zber plodov
8" (20cm)	1	14-16 týždňov	17-19 týždňov
12" (30cm)	1	15-17 týždňov	18-20 týždňov